

Méthode des rectangles pour un calcul d'aire

Issue d'un T-P fait avec des élèves de Terminale S.

Considérons la fonction f définie sur $[0; 1]$ par : $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Nous cherchons à déterminer l'aire du domaine $\mathcal{D} = \{M(x; y) / 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}$.

Pour cela, nous allons utiliser la méthode des rectangles.

Dans un repère orthonormal $(O; \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$, C_f est la courbe représentative de la fonction f . \mathcal{D} est le domaine situé sous la courbe C_f .

On choisit de prendre l'aire du carré $OIKJ$ pour unité d'aire et on se propose de déterminer l'aire \mathcal{A} de \mathcal{D} . Pour cela :

- on subdivise l'intervalle $[0; 1]$ en n intervalles de longueur $\frac{1}{n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$;
- sur chaque intervalle $\left[\frac{k}{n}; \frac{k+1}{n} \right]$ (avec $0 \leq k \leq n-1$), on construit le rectangle R_k de hauteur $f\left(\frac{k}{n}\right)$ et le rectangle R'_k de hauteur $f\left(\frac{k+1}{n}\right)$.

Déclarons la fonction qui va calculer la somme des aires des rectangles R_k sous la courbe C_f :

```
--> function [s]=sommeinf(a,b,n)
--> s=0; for k=0:n-1; s=s+f(a+k*(b-a)/n); end
--> s=s*(b-a)/n,
```



```
--> endfunction
```

Faisons de même avec la somme des rectangles R'_k au-dessus de C_f :

```
--> function [S]=sommestup(a,b,n)
--> S=0; for k=1:n;S=S+f(a+k*(b-a)/n);end
--> S=S*(b-a)/n
--> endfunction
```

Vous remarquerez que l'on a pas encore défini la fonction f et que ces deux sous-programmes sont utilisables pour d'autres fonctions que celle définie plus haut et sur un autre intervalle que $[0; 1]$.

Déclarons donc notre fonction f :

```
--> function y=f(x) ;y=1/(1+x^2);endfunction
```

Demandons les approximations pour $n = 100$, n étant le nombre de subdivisions de l'intervalle $[0; 1]$


```
--> sommeinf(0,1,100)
ans =
0.787894
--> sommestup(0,1,100)
ans =
0.782894
```

Demandons maintenant de calculer les approximations pour n variant de 1 à 100 et traçons ce que nous obtenons :

```
--> for i=1:100;s(i)=sommeinf(0,1,i);S(i)=sommestup(0,1,i);end
--> z=%pi/4;
--> x=1:100;
```



```
--> legends(['sommes inf'; 'sommes sup'; 'la limite des deux suites'], [5, 3, 2], 'ur')
--> plot(x, s, "r+", x, S, "g+"), plot(x, z)
```



On observe que les deux suites ainsi définies semblent être adjacentes.



Elles convergent vers un réel l que l'on admettra être égal à $\frac{\pi}{4}$, en effet vous verrez après la terminale que $\int_0^1 f(x)dx = \frac{\pi}{4}$, ce qui est une autre affaire...

