

DS N°1

Samedi le: 12-October-2002
Programme : Denombrement & Nombres Réels
Durée : 3h

Problème :

Préambule:

- On se propose de chercher la forme générale des sous groupes de $(\mathbb{R}, +)$.
 - Rappel : Un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est une partie H de \mathbb{R} vérifiant : $0 \in H$ et $\forall (x, y) \in H^2$ on a $x - y \in H$.
 - Dans tout le problème H désigne un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$ et $a = \inf(H \cap \mathbb{R}^{+*})$.
1. (0,5 pts) Montrer que $(H \cap \mathbb{R}^{+*} \neq \emptyset \Leftrightarrow H \cap \mathbb{R}^{-*} \neq \emptyset)$.
 2. (0,5 pt) en déduire que a existe.
 3. On suppose dans cette question que : $a \neq 0$, et on veut montrer que $H = a\mathbb{Z}$.
 - a. On suppose que $a \notin H$
 - i. (0,75 pts) Soit $\varepsilon > 0$, montrer que : $\exists (x, y) \in H^2$ tel que : $x \neq y$ et vérifiant : $(a < x < a + \varepsilon$ et $a < y < a + \varepsilon)$.
 - ii. (1 pt) En choisissant ε convenable tirer une contradiction.
 - b. (0,5 pt) En déduire que $a\mathbb{Z} \subset H$.
 - c. (1 pt) Énoncez et redémontrez le théorème de la division euclidienne sur \mathbb{R} .
 - d. (1,5 pts) Soit $x \in H$, utiliser la question précédente pour montrer que $\exists q \in \mathbb{Z}$ tel que : $x = aq$, conclure que : $H = a\mathbb{Z}$.
 4. On suppose dans cette question que $a = 0$ et on veut démontrer que H est dense dans \mathbb{R} .
 - a. (0,5 pts) Rappeler la définition d'une partie dense dans \mathbb{R} .
 - b. (0,75 pts) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x < y$, montrer que : $\exists b \in H$ tel que : $0 < b < y - x$.
 - c. (1 pt) En déduire que $x < E\left(\frac{y}{b}\right)b < y$. Conclure.
 5. Applications :
 - a. (1,5 pts) Montrer que : $Z(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \text{ tel que : } (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est dense dans \mathbb{R} .
 - b. (1,5 pts) Montrer que les suites $(\cos(n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\sin(n))_{n \in \mathbb{N}}$ sont denses dans $[-1, 1]$.
 - c. (1 pt) Donner la forme générale des sous-groupes de (\mathbb{R}^*, \cdot) .

Exercice :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, de combien de façon on peut faire asseoir n hommes et n femmes autour d'une table ronde à $2n$ sièges en respectant l'alternance homme-femme dans les cas suivants.

- 1. Femmes , hommes et siege numerotés.**
- 2. Femmes et hommes numerotés et sieges non numerotés.**
- 3. Femmes numerotés et sieges et hommes non numerotés.**
- 4. Femmes et sieges numerotés et hommes non numerotés.**
- 5. Femmes et sieges et hommes non numerotés.**

NB :

Pour chaque cas donner la nombre de possibilités avec une justification et demonstration a l'aide du pricnipe des bergers.

Chaque question est notée sur 1 point.