

(5 pts)

**Exercice 2:** On considère les ensembles suivants

$$E = C^0(\mathbf{R}, \mathbf{R})$$

$$F = \{g \in C^1(\mathbf{R}, \mathbf{R}) \mid g(0) = g'(0) = 0 \text{ et } g' \text{ dérivable en } 0\}$$

ainsi que l'application

$$\Phi : E \longrightarrow F$$

$$f \longmapsto \Phi_f : x \mapsto \int_0^x t f(t) dt .$$

0,5 + 0,5  
 0,5 + 0,5  
 1 + 1  
 1

1. Montrer que  $E$  et  $F$  sont des  $\mathbf{R}$ -espaces vectoriels.
2. Vérifier que  $\Phi_f \in F$  et que  $\Phi$  est linéaire.
3. Soit  $g \in F$ . On définit  $f$  par  $f(x) = g'(x)/x$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = g''(0)$ . Montrer que  $f \in E$  et en déduire que  $\Phi$  est surjective.
4. Montrer que  $\Phi$  est un isomorphisme.

(8 pts)

**Exercice 3:** Soit  $E_k = \mathcal{D}^k(\mathbf{R}, \mathbf{R})$  l'espace vectoriel des fonctions  $k$  fois dérivables sur  $\mathbf{R}$ . Soit  $F = \mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R})$ . Soient  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$ .

On note  $\Phi : E_k \rightarrow E_{k-1}$  l'application définie par  $\Phi(f) : x \mapsto x f'(x)$ . On désigne aussi par  $\Phi_a$  et  $\Phi_b$  respectivement les applications  $\Phi_a = \Phi - a \text{Id}$  et  $\Phi_b = \Phi - b \text{Id}$ .

Soit  $\Psi : E_2 \rightarrow F$  donnée par  $\Psi = \Phi_a \circ \Phi_b$ .

0,5  
 0,5

1. Montrer que  $\Psi$  est linéaire.
2. Soit  $S$  le sous-ensemble de  $E_2$  formé des fonctions vérifiant l'équation

$$x^2 f''(x) + (1 - a - b) x f'(x) + a b f(x) = 0. \quad (1)$$

Montrer que  $S$  est un sous-espace vectoriel de  $E_2$ .

1 + 0,5  
 0,5  
 0,5  
 0,5  
 1 + 0,5  
 1  
 1 + 0,5

3. Montrer que  $S = \text{Ker } \Psi$ . En déduire une nouvelle démonstration de la question précédente.
4. (a) Justifier  $\Phi_a \circ \Phi_b = \Phi_b \circ \Phi_a$ .  
 (b) Exprimer  $\Phi_a - \Phi_b$  en fonction de  $\text{Id}_{E_2}$ , de  $a$  et de  $b$ .  
 (c) Montrer que si  $y \in S$ , alors  $\Phi_a(y) \in \text{Ker } \Phi_b$  et  $\Phi_b(y) \in \text{Ker } \Phi_a$ .  
 (d) Montrer que  $S = \text{Ker } \Phi_a \oplus \text{Ker } \Phi_b$ .
5. En déduire les solutions de (1) sur  $\mathbf{R}_+^*$  et  $\mathbf{R}_-^*$ .
6. A quelles conditions sur  $a$  et  $b$  les solutions sur  $\mathbf{R}_+^*$  et  $\mathbf{R}_-^*$  se prolongent-elles en une solution définie sur tout  $\mathbf{R}$ ? A quelles conditions existe-t-il une solution non-nulle?

**Fin**