

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

Corrig DS 8 (07-08) : *Fonctions int \tilde{A} grables*
Fonctions \tilde{A} deux variables

Mardi 06 Mai 2008.

Durée : 4 heures

Problème 1

1) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } f_1(x, y) > 0\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } f_2(x, y) > 0\}$ est un ouvert en tant qu'intersection de deux ouverts, car les fonctions $f_1(x, y) \mapsto x$ et $f_2(x, y) \mapsto y$ sont continues.

2) La linéarité de l'application $T : f \rightarrow T(f)$ découle de celle des dérivées partielles.

3) $T(fh) = fT(h) + hT(f)$ car $\frac{\partial(fh)}{\partial x} = f\frac{\partial h}{\partial x} + h\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial(fh)}{\partial y} = f\frac{\partial h}{\partial y} + h\frac{\partial f}{\partial y}$.

4) $T(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f)T(f)$ car $\frac{\partial(\varphi \circ f)}{\partial x} = (\varphi' \circ f)\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial(\varphi \circ f)}{\partial y} = (\varphi' \circ f)\frac{\partial f}{\partial y}$.

5) D'après les formules du cours : $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\partial t}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\partial t}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial t} \end{cases}$, on en déduit que $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{r} \frac{\partial g}{\partial r} - \frac{y}{x^2} \frac{\partial g}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{r} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\partial g}{\partial t} \end{cases}$,

d'où $T(f) = x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = r\frac{\partial g}{\partial r}$.

6) $Tt = 0$, simple calcul.

7) $T(\varphi \circ t) = (\varphi' \circ t)Tt = 0$, donc $\varphi \circ t \in N_0$.

8) D'après ce qui précède, si $f = \varphi \circ t$, alors $f \in N_0$. Inversement soit $f \in N_0$, alors $T(f) = r\frac{\partial g}{\partial r} = 0$, donc $\frac{\partial g}{\partial r}(r, t) = 0$, donc $g(r, t) = \varphi(t)$, d'où $f(x, y) = g(r, t) = \varphi(t) = \varphi \circ t(x, y)$. Donc $\varphi \circ t$ est la forme générale des éléments de N_0 .

9) $Tr = r$, simple calcul.

- 10) $rf \in N_1 \iff T(rf) = rf \iff rT(f) + fT(r) = rf \iff T(f) = 0$ car $Tr = r$, ainsi $f \in N_1 \iff \frac{1}{r}f \in \mathbb{N}_0 \iff \frac{1}{r}f = \varphi \circ t \iff f = r\varphi \circ t$, c'est la forme générale des fonctions $f \in N_1$.
- 11) Pour $a \in \mathbb{R}$, calculer $T(r^a) = T((x^2 + y^2)^{\frac{a}{2}}) = ar^a$, de la même façon que précédemment, on a $T(r^a f) = r^a T(f) + ar^a f$, donc $r^a f \in N_a \iff f \in N_0$ et on en déduit que la forme générale des fonctions $f \in N_a$ est $f = r^a \varphi \circ t$.
- 12) (*) $Tf - af = bh$ où $h \in N_b$, donc $Th = bh$.
- a) Supposons $a = b$, soit $f_0 = \varphi(r)h$ une solution particulière f_0 où $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^{+*})$, donc $Tf_0 = T((\varphi \circ r)h) = (\varphi \circ r)Th + hT(\varphi \circ r) = (\varphi \circ r)bh + h(\varphi' \circ r)Tr = bf + rh(\varphi' \circ r)$, ainsi $Tf_0 - af_0 = bh$ devient $(b-a)f_0 + rh(\varphi' \circ r) = h$, d'où $r\varphi'(r) = 1$, c'est une équation différentielle du 1^{er} ordre de solution $\varphi(r) = \ln r$. Soit f une solution générale de (*), comme l'est f_0 aussi, alors $T(f - f_0) - a(f - f_0) = 0$, d'où $f - f_0 \in N_a$, donc $f - f_0 = r^a \varphi \circ t$, d'où $f = f_0 + r^a \varphi \circ t = \ln r + r^a \varphi \circ t$ c'est la forme générale des solutions de (*) quand $a = b$
- b) On suppose maintenant que : $a \neq b$. Soit $f_0 = \lambda h$ alors $Tf_0 = \lambda Th = \lambda bh$, $Tf_0 - af_0 = h$ donne $\lambda = \frac{1}{b-a}$. De façon pareille toute solution f de (*) s'écrit sous la forme $f = f_0 + r^a \varphi \circ t = \frac{1}{b-a}h + r^a \varphi \circ t$, c'est la forme générale des solutions de (*) quand $a \neq b$.
- 13) a) Pour cette équation $a = 1$, $h(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - xy}{x^2 + y^2 - xy}$. Les calculs montrent que $Th = 0$, d'où $b = 0$, donc $a \neq b$, d'où $f(x, y) = -h(x, y) + \sqrt{x^2 + y^2} \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, où $\varphi : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 .
- b) Ici $a = 2$, $h(x, y) = \frac{(x^2 + y^2)(x - y)}{x + y}$. Les calculs montrent que $Th = 2h$, d'où $a = b = 2$, donc $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} + (x^2 + y^2) \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, où $\varphi : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 .

Problème 2

La constante d'Euler, la transformée de Laplace et la fonction de Bessel

Partie I : La constante d'Euler.

- 1) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 0$ et $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \geq 0$ (simple étude de fonctions) et $u_n - v_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$, donc (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
- 2) Au voisinage de 0 : $f(x) = \frac{1 - (1-x)^n}{x} = \frac{g(0) - g(x)}{x} \rightarrow -g'(0) = n$ où $g(x) = (1-x)^n$ donc f est intégrable sur $]0, 1]$ car prolongeable par continuité en 0.

- 3) $f(x) = \frac{1 - \sum_{k=0}^n (-1)^k \mathcal{C}_n^k x^k}{x} = \frac{-\sum_{k=1}^n (-1)^k \mathcal{C}_n^k x^k}{x} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \mathcal{C}_n^k x^{k-1}$ est une fonction polynômiale, son degré est $n - 1$, son coefficient dominant est $(-1)^{n-1}$.
- 4) $f(x) = \frac{1 - (1 - x)^n}{x} = \sum_{k=0}^{n-1} (1 - x)^k$, somme d'une suite géométrique.
- 5) D'après ce qui précède on a : $f(t) = \sum_{k=0}^{n-1} (1 - t)^k = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \mathcal{C}_n^k t^{k-1}$, d'où après intégration on obtient : $\int_0^1 f(t) dt = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} \mathcal{C}_n^k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Partie II : La transformée de Laplace.

- 1) Montrer que l'application $e^t f(t) = e^{-t} t^n \xrightarrow{+\infty} 0$, donc est bornée sur $[0, +\infty[$, d'où $f(t) = t^n$ est d'ordre exponentiel, alors que $\forall \alpha > 0$, $e^{-\alpha t} g(t) = e^{t^2 - \alpha t} \xrightarrow{+\infty} +\infty$, donc n'est pas bornée sur $[0, +\infty[$, d'où $f(t) = e^{t^2}$ est n'est pas d'ordre exponentiel.
- 2) $0 \in \mathcal{E}$, évident. D'autre part soit $f, g \in \mathcal{E}$, donc $\exists \alpha > 0, \beta > 0$ tel que $e^{-\alpha t} f(t), e^{-\beta t} g(t)$ soit majorées, alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, la fonction $e^{-(\alpha+\beta)t}(f(t) + \lambda g(t)) = e^{-\beta t} e^{-\alpha t} f(t) + \lambda e^{-\alpha t} e^{-\beta t} g(t)$ est bornée sur $[0, +\infty[$ en tant que somme et produit de fonctions bornées, d'où $f + \lambda g \in \mathcal{E}$, donc \mathcal{E} est un \mathbb{R} -espace vectoriel.
- 3) Soit $f \in \mathcal{E}$, donc $\exists \alpha > 0, M > 0$ tel que $|e^{-\alpha t} f(t)| \leq M$ sur $[0, +\infty[$, on peut toujours prendre $\alpha > x + 1$, quitte à remplacer α par $\alpha + x + 1$, donc $|e^{-xt} f(t)| \leq |e^{-\alpha-1t} f(t)| \leq M e^{-t}$, qui est intégrable, donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t) dt$ est bien définie. La linéarité de l'application $f \mapsto L(f)$ découle de celle de l'intégrale.
- 4) a) Si $f(t) = t^n$, $n \geq 1$, à l'aide d'une intégration par parties, on trouve que $I_n = L(f)(x) = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n I_{n-1}$, d'où $I_n = n!$, par récurrence.
- b) Si $f(t) = e^{-at}$, $a > 0$, alors $L(f)(x) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+x)t} dt = \frac{1}{a+x}$
- c) Si $f(t) = t^n e^{-at}$, $a > 0, n \geq 1$, à l'aide d'une intégration par parties, on trouve que $I_n = L(f)(x) = \int_0^{+\infty} t^n e^{-(x+a)t} dt = \frac{n}{x+a} I_{n-1}$, d'où $I_n = \frac{n!}{(x+a)^n}$.
- d) Si $f(t) = e^{-at} \sin(bt)$, $a, b > 0$, alors $L(f)(x) = \mathcal{R}e \left(\int_0^{+\infty} e^{-(x+a+ib)t} dt \right) = \left[\frac{e^{-(x+a+ib)t}}{-(x+a+ib)} \right]_0^{+\infty} = \left[e^{-(x+a)t} \frac{e^{ibt}}{-(x+a+ib)} \right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{e^{-(x+a)t}}{(x+a)^2 + b^2} ((x+a) + ib) e^{ibt} \right]_0^{+\infty}$.
- e) $f(t) = e^{-at} \cos(bt)$, $a, b > 0$.
- 5) Soit $f \in \mathcal{E}$ tel que $f' \in \mathcal{E}$, montrer que $L(f')(x) = xL(f)(x) - f(0)$, $\forall x > 0$.
- 6) Soit $f \in \mathcal{E}$ tel que $f', f'' \in \mathcal{E}$, montrer que $L(f'')(x) = x^2 L(f)(x) - x f'(0) - f''(0)$, $\forall x > 0$.

- 7) Retrouver la formule de $L(f)(x)$ quand $f(t) = t^n$, $n \geq 1$.
- 8) **Application.** Dans la suite du problème, on admettra que l'application $f \mapsto L(f)$ est injective sur \mathcal{E} , et on se propose de résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} X'(t) = X(t) + 2Y(t) \\ Y'(t) = Y(t) + e^t \\ X(0) = 0 \\ Y(0) = 0 \end{cases}$$

Pour cela on pose $x(s) = L(X)(s)$ et $y(s) = L(Y)(s)$.

- a) Écrire le système d'équations vérifiées par les fonctions x et y .
- b) Résoudre ce système, puis en déduire $X(t)$ et $Y(t)$.

Partie III : La fonction de Bessel.

On admet dans cette partie qu'on peut dériver à l'intérieur d'une intégrale, et qu'on peut aussi permuter l'ordre d'intégration. Pour tout réel x , on pose

$$B(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \cos t) dt$$

- 1) Exprimer J' et J'' à l'aide d'intégrales.
- 2) Montrer que $J'(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos(x \cos t) dt$, puis que J est solution de l'équation différentielle $xy''(x) + J'(x) + xJ(x) = 0$.
- 3) Pour tout réel $x > 0$, on pose $I(x) = \int_0^\pi \frac{1}{x^2 + \cos^2 t} dt$.
- a) Montrer que $I(x) = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{x^2 + \cos^2 t} dt$.
- b) Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{x^2 + \cos^2 t} dt$, à l'aide d'un changement de variable approprié, puis en déduire $I(x)$.
- 4) Calculer la transformée de Laplace de la fonction de Bessel J .

Partie IV : Transformée de Laplace de la fonction logarithmique.

Dans cette partie on admet qu'on peut permuter intégrales et limites.

- 1) Montrer que la fonction $g : t \mapsto e^{-t} \ln t$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.
- 2) Pour tout réel $x > 0$ et entier $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :
$$\begin{cases} U_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n \ln x & \text{si } x \in]0, n] \\ U_n(x) = 0 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$
- a) Pour $x > 0$ fixé, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n(x)$.
- b) Montrer que $\forall x > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq |U_n(x)| \leq e^{-x} |\ln x|$, puis en déduire que U_n est intégrable sur $]0, +\infty[$.
- 3) On pose $J_n = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt$, justifier l'existence de J_n puis calculer sa limite.

- 4) Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Justifier l'intégrabilité de la fonction $t \mapsto t^p \ln(nt)$ sur $]0, 1]$ puis calculer $\int_0^1 t^p \ln(nt) dt$.
- 5) Exprimer J_n en fonction de u_n .
Indication : On pourra utiliser la question $(k+1)\mathcal{C}_{n+1}^{k+1} = (n+1)\mathcal{C}_n^k$ et la question 5 de la partie I.
- 6) En déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} \ln t dt$ en fonction de la constante d'Euler, γ .
- 7) Montrer que la transformée de Laplace est bien définie pour tout $x > 0$, puis la calculer.

Fin.