

Feuille d'exercices:

Séries Entières

Partie I : Les Must To Do

Blague du jour :

Bonjour, vous avez rejoint la messagerie vocale d'aide psychiatrique.

- Si vous tes dépressif, le numéro sur lequel vous appuyerez est sans importance, personne ne répondra.
- Si vous êtes un compulsif à la répétition, raccrochez et recomposez.
- Si vous êtes un agressif-passif, mettez-nous en attente.
- Si vous êtes antisocial, arrachez le téléphone du mur.
- Si vous avez des difficultés d'attention, ne vous occupez pas des instructions.

Mathématicien du jour

Taylor

Brook Taylor (1685-1731) est un éclectique homme de sciences anglais . Il s'intéressa aux mathématiques, à la musique, la peinture et la philosophie. Il ajouta aux mathématiques une nouvelle branche appelée « calcul de différences finies », inventa l'intégration par partie, et découvrit les séries appelées « développement de Taylor ».



1 Séries Entières

Exercice 1 Trouver le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$:

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \neq 0$.

Indication: $R = 1$.

2) (a_n) est périodique non nulle.

Indication: $R = 1$.

3) $a_n = \sum_{d|n} d^2$.

Indication: $R = 1$.

4) $a_n = \frac{n^n}{n!}$.

Indication: $R = \frac{1}{e}$.

5) $a_{2n} = a^n$, $a_{2n+1} = b^n$, $0 < a < b$.

Indication: $R = \frac{1}{\sqrt{b}}$.

6) $a_{n^2} = n!$, $a_k = 0$ si $\sqrt{k} \notin \mathbb{N}$.

Indication: $R = 1$.

7) $a_n = (\ln n)^{-\ln n}$.

Indication: $R = 1$.

8) $a_n = e^{\sqrt{n}}$.

Indication: $R = 1$.

9) $a_n = \frac{1.4.7 \dots (3n-2)}{n!}$.

Indication: $R = \frac{1}{3}$.

10) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt[n]{n}}$.

Indication: $R = 1$.

11) $a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)^{\ln n}$.

Indication: $R = 1$.

12) $a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n$, $a_0 = a_1 = 1$.

Indication: $R = \sqrt{2} - 1$.

13) $a_n = C_{kn}^n$.

Indication: $R = \frac{(k-1)^{k-1}}{k^k}$.

14) $a_n = e^{(n+1)^2} - e^{(n-1)^2}$.

Indication: $R = 0$.

15) $a_n = \int_{t=0}^1 (1+t^2)^n dt$.

Indication: $R = \frac{1}{2}$, $2t \leq 1 + t^2 \leq 2$.

16) $a_n = \sqrt[n]{n} - \sqrt[n+1]{n+1}$.

Indication: $R = 1$, $a_n \sim \frac{\ln n}{n^2}$.

17) $a_n = \frac{\cos n\theta}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.

Indication: $R = 1$.

Exercice 2 Exercices d'oral.

- 1) **Oral Mines MP 2003** : Quel est le rayon de convergence de la série entière : $\sum_{k=0}^{\infty} \cos^k \left(\frac{2k\pi}{5} + \alpha \right) x^k$ où $\alpha \in \mathbb{R}$?

Indication: La suite $\left(\cos \left(\frac{2k\pi}{5} + \alpha \right) \right)_{k \in \mathbb{N}}$ est périodique de période 5, donc prend au plus cinq valeurs distinctes. soit a celle de plus grande valeur absolue. Montrer que $R = \frac{1}{|a|}$.

- 2) **Ensi MP 2003** : Rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sum_{k=1}^n k^{-\alpha}}$ et étude pour $x = \pm R$.

Indication: Trouver un équivalent simple de $\sum_{k=1}^n k^{-\alpha}$

Exercice 3 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Déterminer les rayons de convergence des séries :

1) $\sum a_n^2 z^n$.

Indication: $R' = R^2$.

2) $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$.

Indication: $R' = \infty$.

3) $\sum \frac{n! a_n}{n^n} z^n$.

Indication: $R' = eR$.

Exercice 4 On suppose que les séries $\sum a_{2n} z^n$ et $\sum a_{2n+1} z^n$ ont pour rayons de convergence R et R' . Montrer que le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est égal à $\min(\sqrt{R}, \sqrt{R'})$.

Exercice 5 Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on pose $u_n(x) = \left(\frac{x(1-x)}{2} \right)^{4^n}$.

- 1) Montrer que $] -1, 2[$ est le domaine de convergence de la série $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$.

- 2) On développe $u_n(x)$ par la formule du binôme : $u_n(x) = \sum_{4^n \leq k \leq 2 \cdot 4^n} a_k x^k$. (en convenant que les a_k non définis valent zéro).

Montrer que pour $0 \leq k \leq 4^n$, on a $|a_k| \leq C_{4^n}^{4^n/2} / 2^{4^n}$ avec égalité pour $k = 4^n/2$.

En déduire que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k \geq 1} a_k x^k$ est égal 1

Que doit-on retenir de cet exercice

Exercice 6 Développer en série entière les fonctions suivantes :

1) $\ln(1+x+x^2)$.

Indication: $\ln(1+x+x^2) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x)$

2) $(x-1)\ln(x^2-5x+6)$.

Indication: Factoriser : $x^2 - 5x + 6$.

3) $x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

Indication: Dériver

4) $\frac{x-2}{x^3-x^2-x+1}$.

Indication: $\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{2n+5}{4}$

5) $\frac{1}{1+x-2x^3}$.

Indication: Décomposer

en éléments simples.

6) $\frac{1-x}{(1+2x-x^2)^2}$.

Indication: Intégrer.

7) $e^{-2x^2} \int_0^x e^{2t^2} dt$.

Indication: Dériver

Exercice 7 Développement en série entière de $\zeta(1+x) - 1/x$

- 1) Vérifier que pour $x \in]0, +\infty[$ on a : $\zeta(1+x) - \frac{1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^{1+x}} - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right) \right)$.
- 2) Pour $p \in \mathbb{N}$ on pose $\gamma_p = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln^p(1)}{1} + \dots + \frac{\ln^p(k)}{k} - \frac{\ln^{p+1}(k+1)}{p+1} \right)$. Justifier l'existence de γ_p et montrer que $|\gamma_p| \leq (p/e)^p$.
- 3) Montrer alors que pour $x \in]0, 1[$ on a : $\zeta(1+x) - \frac{1}{x} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p \gamma_p}{p!} x^p$.

Exercice 8 Calculer les sommes des séries suivantes :

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$.</p> <p>2) $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$.</p> <p>Indication: $\frac{x+x^2}{(1-x)^3}$.</p> <p>3) $\sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n$.</p> <p>Indication: $\frac{x(1+4x+x^2)}{(1-x)^4}$.</p> <p>4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)(n+3)}$.</p> <p>Indication: $\frac{2(1-x^2)\ln(1-x)}{4x^3}$ (décomposer en éléments simples).</p> <p>5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \cosh(na)$.</p> <p>Indication: $-\frac{1}{2} \ln(1 - 2x \cosh a + x^2)$.</p> | <p>6) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n \sin^2(n\theta)}{2^n}$.</p> <p>Indication: $\frac{1}{5 \cos 2\theta - 4}$ (linéariser).</p> <p>7) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n+1} x^n$.</p> <p>Indication: $\frac{2x-1}{(1-x)^2} - \frac{2 \ln(1-x)}{x}$.</p> <p>8) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$.</p> <p>Indication: $\frac{\cosh \sqrt{x}}{4x^3}$ pour $x \geq 0$ et $\frac{\cos \sqrt{-x}}{4x^3}$ pour $x \leq 0$.</p> <p>9) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^2(n\theta)}{n!} x^{2n}$.</p> <p>Indication: $\frac{e^{x^2}}{2} - \frac{e^{x^2 \cos 2\theta}}{2} \cos(x^2 \sin 2\theta)$.</p> | <p>10) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^5 x^n}{n!}$.</p> <p>Indication: $(x + 15x^2 + 25x^3 + 10x^4 + x^5)e^x$.</p> <p>11) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.</p> <p>Indication: $\frac{e^x + 2e^{-x/2} \cos(x\sqrt{3}/2)}{3}$, ($f''' = f$).</p> <p>12) $\sum_{n=1}^{\infty} C_{2n}^{n+1} x^n$.</p> <p>Indication: $\frac{1 - \sqrt{1-4x} - 2x}{2x\sqrt{1-4x}}$.</p> <p>13) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_1^x \ln^n t \, dt$.</p> <p>Indication: $\frac{x^2-1}{2}$.</p> <p>14) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n$.</p> <p>Indication: $-\frac{\ln(1-x)}{1-x}$.</p> |
|---|---|---|

Exercice 9 Produit de Cauchy.

- 1) Soit (c_n) le produit de Cauchy de la suite (a_n) par la suite (b_n) . Montrer que si les trois séries $\sum a_n$, $\sum b_n$ et $\sum c_n$ convergent vers A, B, C , alors $C = AB$.
- Indication:** considérer les séries entières $\sum a_n z^n$, $\sum b_n z^n$ et $\sum c_n z^n$ puis utiliser le principe de la continuité radiale.
- 2) Soit (c_n) le produit de Cauchy de la suite (a_n) par la suite (b_n) . On suppose que la série $A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ a un rayon $R > 0$ et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = \lambda$ avec $|\lambda| < R$.
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{c_n}{b_n} = A(\lambda)$.
- Indication:** $\frac{c_n}{b_n} = a_0 + a_1 \frac{b_{n-1}}{b_n} + \dots + a_n \frac{b_0}{b_n} = \sum_{k=0}^n a_k u_{n,k}$ puis appliquer le théorème de convergence dominée.

Exercice 10 Étude sur le cercle de convergence

1) Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$.

a) Montrer que le rayon de convergence est égal à 1.

b) Étudier la convergence de f pour $x = \pm 1$.

c) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

2) Soit (a_n) et (b_n) deux suites de réels strictement positifs telles que $b_n \sim a_n$. On suppose que le rayon de convergence de la série entière $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est 1 et que la série diverge pour $x = 1$.

a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} A(x) = +\infty$.

b) On pose $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. Montrer que $B(x) \sim A(x)$ pour $x \rightarrow 1^-$.

Indication: Démonstration de type Césaro.

Exercice 11 Fonction de classe C^∞ non DSE

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n+n^2 ix}$. Montrer que f est de classe C^∞ sur \mathbb{R} mais n'est pas développable en série entière autour de 0.

Indication: $|f^{(k)}(0)| = \sum_{n=0}^{\infty} n^{2k} e^{-n} \geq k^{2k} e^{-k}$ et $R = 0$.

Exercice 12 Équations différentielles.

1) Montrer que l'équation $3xy' + (2-5x)y = x$ admet une solution développable en série entière autour de 0.

2) **DSE de tan**

a) En utilisant la relation : $\tan' = 1 + \tan^2$, montrer que $\tan^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k \tan^{(k)} \tan^{(n-1-k)}$.

b) Montrer que la série de Taylor de tan en 0 converge absolument sur $] -\pi/2, \pi/2[$.

c) Soit f la somme de la série précédente. Montrer que $f' = 1 + f^2$ et en déduire que $f = \tan$.

d) Prouver que le rayon de convergence est exactement $\pi/2$.

3) On pose $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$.

a) Montrer que f admet un développement en série entière au voisinage de 0 et préciser le rayon de convergence.

b) Chercher une équation différentielle d'ordre 1 vérifiée par f . En déduire les coefficients du développement en série entière de f .

c) Donner le développement en série entière de $\arcsin^2 x$.

Exercice 13 On note T_n le nombre de partitions d'un ensemble n éléments.

1) Montrer que $T_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} T_k$. On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T_n x^n}{n!}$

2) Préciser le rayon de convergence, puis calculer f' . En déduire que $f(x) = e^{e^x - 1}$.

Exercice 14 Calcul d'intégrales.

Calculer les intégrales suivantes après avoir justifié leurs existences.

$$1) \int_0^1 t^t dt$$

$$2) \int_0^1 \ln(t) \ln(1-t) dt$$

$$3) \int_0^1 \frac{\ln(t^2) \ln(1-t^2)}{t^2} dt.$$

$$4) \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt.$$

Exercice 15 Fonction ζ

Pour $|x| < 1$ on pose : $Z(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \zeta(2n)x^n$.

$$1) \text{ Justifier minutieusement que } \begin{cases} Z(x) = \sum_{p \geq 1} \frac{x}{p^2 - x} \\ Z'(x) = \sum_{p \geq 1} \frac{1}{p^2 - x} + \sum_{p \geq 1} \frac{x}{(p^2 - x)^2} \\ Z^2(x) = \sum_{p \neq q} \frac{x^2}{q^2 - p^2} \left(\frac{1}{p^2 - x} - \frac{1}{q^2 - x} \right) + \sum_{p \geq 1} \frac{x^2}{(p^2 - x)^2} \end{cases}$$

$$2) \text{ Pour } p \text{ fixé, montrer que } \sum_{q \neq p} \frac{1}{q^2 - p^2} = \frac{3}{4p^2}.$$

$$3) \text{ En déduire que } Z \text{ vérifie l'équation différentielle : } 2xZ'(x) - 2Z^2(x) + Z(x) = 3x\zeta(2)$$

$$4) \text{ En déduire la relation de récurrence : } \forall n \geq 2, (n + \frac{1}{2})\zeta(2n) = \sum_{p=1}^{n-1} \zeta(2p)\zeta(2n - 2p).$$

$$5) \text{ Sachant que } \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \text{ en déduire } \zeta(4) \text{ et dire comment calculer } \zeta(2n), \forall n \geq 3.$$